Klartan® 24 AF



DIRECTO, INCLUSO EN FLORACIÓN

Insecticida imprescindible en frutales y hortícolas. Combina una alta eficacia aficida con el respeto de la mayoría de los artrópodos auxiliares, por lo que se puede aplicar en cualquier momento, incluso en floración. Además, encaja perfectamente con el uso de cualquier neonicotinoide aficida, debido a su distinto modo de acción.

Derivado ácido aminado, muy activo por contacto e ingestión, y muy estable a la luz y al calor. Como insecticida, es de destacar su amplio espectro, fuerte acción de choque y repelencia duradera. Posee acción complementaria contra ácaros tetraníquidos.

Composición	Tau-fluvalinato 24% p/v (240 g/l)
Formulación	Suspensión Concentrada (SC)
R.O.P.M.F. n°	18.498
Envasado	250 cc, 1 Litro, 5 Litros
Clasificación	Nocivo (Xn), Peligroso para el Medio Ambiente (N) Mamíferos: A Aves: A Peces: C Compatible con abejas

APLICACIONES AUTORIZADAS

Cítricos (caparreta, prays y pulgones); **almendro** (barrenillos, mosquito verde y tigre); **frutales de pepita** (psila y pulgones); **frutales de hueso** (pulgones); **melocotonero y nectarino** (mosquito verde, trips y pulgón); **patata y tomate** (mosca blanca, orugas, pulgones y trips); **judías verdes** (mosca blanca, orugas, pulgones y trips); **alcachofa** (mosca blanca, orugas, pulgones y trips); **alfalfa** (apión, pulgones y sitona); **algodonero** (araña roja, gusano rosado, heliotis, pulgones y trips); **trigo** (garrapatillo); **arbustos ornamentales** (araña roja, heliotis, pulgones y trips), **ornamentales herbáceas** (araña roja, heliotis, pulgones y trips).

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización normal al observar los primeros síntomas del ataque, a la dosis de 10-20 cc/hl, mojando bien las hojas por ambas caras. Seguir la pauta de tratamientos que indique la biología del insecto y las condiciones climáticas.

Albaricoquero y cerezo, tratar hasta floración.

Melocotonero y nectarino, hasta floración, para trips 40-60 cc/hl; para mosquito verde 20-30 cc/hl, aplicando un máximo de 0,6 l/ha y aplicación. En ambos casos tratar a la aparición de la plaga, pudiendo repetir cada 10-15 días si se mantienen condiciones favorables para su desarrollo, con un máximo de 4 aplicaciones por campaña.

Algodón para pulgón y trips emplear 10-20 cc/hl; para araña roja 10-50 cc/hl, para heliotis y gusano rosado 30-40 cc/hl.

Limonero para prays, dosificar a razón de 30-40 cc/hl.

Arbustos ornamentales y ornamentales herbáceas, para pulgones y trips 10-20 cc/hl, para araña roja 10-50 cc/hl y para heliotis 30-40 cc/hl.

Trigo y Alfalfa emplear 100-200 cc/ha.

PLAZO DE SEGURIDAD

Almendro, judías verdes, algodón y tomate: 7 días • Restantes cultivos de consumo: 14 días • Ciruelo: 21 días • Cítricos: 28 días • Frutales de pepita: 75 días • Melocotonero, nectarino, albaricoquero y cerezo: No procede por época de aplicación.

R9